

Tableau 3: Vermifuges couramment utilisés pour les chiens [23, 24].

ACTION	NOM DEPOSE ET LABORATOIRE	PRINCIPE ACTIF	INDICATION	POSOLOGIE CHIEN
Nématocides et taenicides	Drontal BAYER	Fébantel+ pyrantel+ praziquantel	Trichures, ascaris, ankylostomes, taenias, dipylidium, échinococcus	15 mg/kg de febantel, 5 mg/kg de pyrantel et 5 mg/kg de praziquantel
	Flubenol JANSSEN	Flubendazole	Ascaris, ankylostomes, trichures	22 mg/kg/j pendant 2 à 3 jours
	Buccalox ou Gelminthe CLEMENT-THEKAN, Stromiten VETOQUINOL	Lévamisole+ niclosamide	Ascaris, ankylostomes, taenias	4 mg/kg de lévamisole, 180 mg/kg de niclosamide
	Telkan CLEMENT-THEKAN, Telmin JANSSEN	Mébéndazole	Ascaris, trichures, ankylostomes, taenias	3-50 mg/kg pendant 2 à 5 jours
	Ascetene VETO-CENTRE, Perhelmin TVM	Pyrantel+ niclosamide	Ascaris, ankylostomes, taenias	100-200 mg/kg de niclosamide, 12-25 mg/kg de pyrantel
	Panacur INTERVET	Fenbendazole	Ascaris, trichures, ankylostomes, taenias	50 mg/kg/j pendant 3 jours
	Vitaminthe VIRBAC, Polyverkan CLEMENT-THEKAN	Oxibendazole+ niclosamide	Ascaris, ankylostomes, taenias	15 mg/kg d'oxibendazole, 120 mg/kg de niclosamide
	Lopatol NOVARTIS, Troscan VIRBAC	Nitroscanate	Ascaris, ankylostomes, taenias	50 mg/kg
	Dolthene MERIAL, Synanthic MERIAL, Oxfenil VIRBAC	Oxfendazole	Ascaris, trichures, ankylostomes, taenias	11,3 mg/kg/j pendant 3 jours
Ascaricides et/ou ascarifuges	Strongid PFIZER	Pyrantel	Ascaris, ankylostomes	5 mg/kg en une prise
	Ascapiperazine VETOQUINOL, Plurivers VETO-CENTRE, Soluerm BIOVE, Citrate de pipérazine COOPHAVET	Pipérazine	Ascaris	150 mg/kg, 2 fois à 12 heures d'intervalle, renouveler le traitement 8-10 jours plus tard
Nématocides	Dovenix MERIAL	Nitroxinil	Ankylostomes	10-15 mg/kg
Ténicides et ténifuges	Droncit BAYER, Plativers VETO-CENTRE	Praziquantel	Taenias	5 mg/kg
Nématocides et acaricides	Interceptor NOVARTIS	Milbémycine oxime	Ascaris, ankylostomes, trichures, démodécie, dirofilariose	0,5 mg/kg
Nématocides et cestocides	Milbémax NOVARTIS	Milbémycine oxime + praziquantel	Ascaris, trichures, ankylostomes, taenias	0,5 mg/kg de milbémycine oxime, 5 mg/kg de praziquantel
Nématocides, insecticides et acaricides	Stronghold PFIZER	Sélamectine	Puces, dirofilariose, gale sarcoptique, poux, ascaris	6-12 mg/kg
	Ivomec MERIAL	Ivermectine	Strongyloses gastro-intestinales ou pulmonaires, gales, phtyrioses	0,4-0,5 mg/kg hors AMM
Anticoccidien	Vecoxan JANSSEN	Diclazuril	Eimeria	2,5 mg/kg hors AMM